

FIMOZA

Što je fimozza?

Fimoza je naziv za suženje kožice penisa (prepućija) koja se ne može prevući preko glavića. Može biti prirodena, nastati nakon jaće upale ili kada je kod prevlaćenja prepućija došlo do pucanja kožice i stvaranja ožiljka.

Prepućij je tijekom prve godine života uži i slijepjen za glavić (priraslice) te se najčešće ne može prevući preko glavića. To je normalno stanje i postupno se tijekom rasta djeteta razrješava samo od sebe. Ovaj proces ne treba požurivati prevlaćenjem na silu jer će se priraslice ponovno stvoriti i može doći do pucanja kožice i stvaranja ožiljka.

Lijećenje

Fimoza se lijeći kirurškim zahvatom – cirkumcizijom (obrezivanjem). Tijekom zahvata se u općoj anesteziji odstrani uski dio prepućija. Priraslice glavića i prepućija te normalno suženje prepućija kod manje djece nije potrebno lijećiti.

Stećena fimozza s ožiljkom koji sužava otvor na prepućije se može pokušati lijećiti mazanjem ožiljka kremom s kortikosteroidom betametazonom kroz 4-6 tjedana. Mazanje ove kreme na kožicu neće dovesti do nuspojava koje kortikosteroidi mogu imati kada se daju u puno višim dozama injekcijama ili u tabletama kod nekih drugih bolesti (npr. autoimmune bolesti). Mazanje kremom je uspješno u otprilike 50% dječaka, a rezultati su bolji kod manje djece. Ako se ne uspije kremom postići željeni učinak, potrebna je cirkumcizija.

Oporavak

Otpust kući je isti ili idući dan. Končići se sami razgrađuju i otpadaju kroz dva tjedna. Prvih nekoliko dana se može između šava pojaviti manja kolićina sućrvice. Oteklina nakon operacije se sama povlaći, no može biti prisutna i do šest mjeseci, dok se ne uspostavi normalna limfna drenaža.

ZAPAMTITE

- važno je razlikovati fimozzu, normalno suženje prepućija kod male djece i normalne priraslice glavića i kože
- lijećenje je potrebno kod fimozze, dok intervencije kod druga dva stanja koja su normalna treba izbjećavati