



KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Predstojnik: Doc.dr.sc. Tomislav Jukić

UKLANJANJE PTERIGIJA

Poštovani,


Pterigij je patološko zadebljanje spojnice očne jabučice koje prelazi preko rožnice i utječe na vid.

KAKO SE ZAHVAT IZVODI?

Operacija se obavlja u lokalnoj/lokalno-potenciranoj/općoj anesteziji tako da se izbjegne bol. Spojnica se odlušti s rožnice te se defekt zatvori slobodnim ili kliznim transplantatom uz korištenje resorptivnih šavova. Cijeli postupak traje u prosjeku 30 minuta. Nakon završetka operativnog zahvata potrebno je mirovanje u krevetu 2-3 sata uz prevoj.



Primjer pterigija



Uzimanje slobodnog transplantata bulbarne spojnice da bi se prekrilo mjesto nastalog defekta



Stanje po eksciziji pterigija



Šesti tjedan po operaciji pterigija

KAKO MI UKLANJANJE PTERIGIJA MOŽE POMOĆI I ŠTO AKO SE NE PROVEDE?

Navedenim postupkom se u cijelosti uklanja patološko zadebljnje sluznice čime se smanjuje utjecaj pterigija na vidnu oštrinu.

Ukoliko se zahvat ne provede, postepenim rastom pterigija očekuje se progresivno smanjenje vidne oštrine.

MOGUĆI RIZICI

Kao i svi medicinski postupci i ovaj ima mogućnost komplikacija. Moguće je krvarenje iz mjesta reza, ali ta krvarenja su obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju druge mjere liječenja. Moguće je prolazno žuljanje u oku zbog šavova. Rjeđe u kasnijem poslijeoperacijskom periodu nastane ožiljkasta deformacija tkiva koja zahtijeva kiruršku korekciju.

NEMA MOGUĆNOSTI

ZAMJENE ZA PREPORUČENI

POSTUPAK.

